Preen®

LAWN

BROADLEAF WEED CONTROL

COVERS 15,000 SQ. FT.

CUBRE 1394 m²

MADE IN USA

Preen®

LAWN

CÉSPED

BROADLEAF WEED CONTROL

CONTROL DE MALEZA DE HOJA ANCHA

- Controls dandelions and 200 other broadleaf weeds
  Controla los dientes de león y 200 otras malezas de hoja ancha
- Will not burn your lawn
  No quemará su césped
- Apply in spring or fall
  Aplicar en primavera u otoño

COVERS **15,000** SQ. FT.

CUBRE 1394 m²

COVERS
15,000 SQ. FT.
Net Wt. 30 lbs. (13.61 kg)

CUBRE 1394 m² (15.000 pies²)
Peso neto: 13.61 kg (30 lb)

Does not contain fertilizer *No contiene fertilizante*

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION
See back panel for Precautionary Statements.

MANTENGA ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN
Consulte el panel posterior para otras medidas de precaución.

ACTIVE INGREDIENTES:

2,4-dichlorophenoxyacetic acid	**1.37%**
(+)-(R)-2-(2 methyl-4-chlorophenoxy) propionic acid	**0.31%**
Dicamba; 3,6-dichloro-o-anisic acid	**0.13%**
OTHER INGREDIENTS:	**98.19%**
TOTAL:	**100.00%**

THIS PRODUCT CONTAINS:
27.4 lbs. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per ton.
6.2 lbs. (+)-(R)-2-(2 methyl-4-chlorophenoxy) propionic acid equivalent per ton.
2.6 lbs. 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per ton.

Isomer Specific by AOAC Methods.
Contains the single isomer form of Mecoprop-p.

INGREDIENTES ACTIVOS:

Ácido 2,4-diclorofenoxiacético	*1,37%*
Ácido propiónico 2-(+)(R)-2-(2 metil-4-clorofenoxi)	*0,31%*
Dicamba; ácido 3,6-dicloro-o-anísico	*0,13%*
OTROS INGREDIENTES:	*98,19%*
TOTAL:	*100,00%*

ESTE PRODUCTO CONTIENE:
27,4 kg (27,4 lb) de ácido 2,4 diclorofenoxiacético equivalente por tonelada
6,2 kg (6,2 lb) de ácido (+)-(R)-2-(2metil-4 clorofenoxi) propiónico equivalente por tonelada
2,6 kg (2,6 lb) de ácido 3,6 dicloro-o-anísico equivalente por tonelada

Isómero específico según los métodos AOAC
Contiene únicamente la forma de isómero Mecoprop-p

COVERS **15,000** SQ. FT.

CUBRE 1394 m²

CONTROL DE MALEZA DE HOJA ANCHA

LAWN

BROADLEAF WEED CONTROL

Preen®

STOP! READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.

Directions for Use

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

PRECAUTIONS AND RESTRICTIONS:

- Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled.
- Apply when the air is calm. Do not apply to newly seeded lawns. Do not exceed specified dosages for any area. During application, close spreader openings when turning.
- Do not use this product on or near desirable plants, including within the drip line of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result.
- Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans. Do not apply when windy. Apply this product directly to your lawn, and sweep any product landing on the driveway, sidewalk, gutter, or street back onto the treated area. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.
PESTICIDE STORAGE: Keep in original container in a cool, dry area away from extreme heat and direct sunlight. Do not store near food, feed, seeds or other pesticides. **PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Non refillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer if recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Use Precautions

Do not allow the material to drift onto flowers, vegetables or ornamental shrubbery. Apply when the air is calm. Do not apply to newly seeded lawns. Do not apply in areas underlaid by roots of desirable trees and shrubs. Do not exceed specified dosages for any area; be particularly careful within dripline of tree and other ornamental species. During application, close spreader openings when turning. Do not contaminate domestic or irrigation waters. Do not use this product on or near desirable plants, including within the drip line of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result. Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays and oceans. Do not apply when windy. Apply this product directly to your lawn and sweep any product landing on the driveway, sidewalk, gutter or street back onto the treated area. To prevent product run-off do not over water the treated area(s) to the point of run-off or apply when raining or when rain is expected that day.

Instructions

Preen Lawn Broadleaf Weed Control controls a wide range of lawn weeds including dandelion, chickweed, knotweed, plantain, henbit, spurge and many others commonly found in home lawns. Possible retreatment may be necessary if (a) lawn is heavily overrun by weeds, or, (b) if adverse low moisture conditions prevail and weeds are in a state of poor growth. A second application may be made in approximately 30 days.

For use on established turf of warm season grasses includes bermudagrass, centipedegrass, and zoysiagrass.

Established turf of cool season grasses includes Kentucky bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue, and turf-type tall fescues. Do not apply this product on carpetgrass, dichondra, St. Augustinegrass, or established turf containing desirable clovers.

The maximum broadcast application rate is 2.0 pounds of product per 1,000 sq.ft. per application. The maximum number of broadcast applications is limited to 2 per year with a minimum of 30 days between applications. The maximum seasonal rate is 4.0 pounds of product per 1,000 sq.ft.

1. Mow lawn to normal height 1 to 2 days before application.
2. Water lawn thoroughly at least 1 day before application to sustain moisture until the next watering (see step 4).
3. Apply when weeds are young and actively growing, preferably in the morning when dew is on the grass. If grass is not moist at the time of application, sprinkle lightly with water to allow the granules to adhere and to remain on the leaf surface of the weeds.
4. **Do not** wash from weed leaves for 1 to 2 days after application. At this time a thorough watering should be made.

Suggested Spreader Settings

It is important to follow the directions as indicated on this quality lawn care product as over application may cause injury to your lawn. Spreader settings are approximate.
Differences may occur due to condition of spread, speed at which applied and roughness of area treated. Be sure to check spreader before beginning, adjusting if necessary. Consult Owner's Manual. Never apply by hand.

The spreader settings are approximate. Calibrate your spreader on 100 sq. ft. and adjust to apply at the rate of 1 lb. of product per 500 sq. ft. (2 lbs. of material per 1,000 sq. ft.). Rate of walk, moisture and spreader condition can vary the spreader setting necessary to apply the correct amount.

Broadcast Spreaders - Apply in a single pass at a rate of 2 lbs. per 1,000 sq. ft. Start on the outside border and apply in a circular path working toward the center. Overlap the coverage slightly, and shut off spreader before making hard turns.

Drop Spreaders - Apply in a single pass at a rate of 2 lbs. per 1,000 sq. ft. Start on the outside border and apply in a rectangular path working back and forth across the length of the lawn. Overlap the coverage slightly, and shut off spreader before making hard turns.

If your spreader model does not appear, go to our website at www.preen.com, or call toll-free (800) 233-1067, 8 A.M. - 5 P.M. EDT, Monday - Friday, for additional model settings.

Broadcast Spreaders
Esparcidor por dispersión

	Setting / *Graduación*
Agri-Fab® Rotary	5
Cyclone® Rotary	4
Earthway® Rotary	16
Greenview® Jet-Spred® SS1	16
Lesco® Rotary (dial A-S)(number dial)	G /15
Red Devil® Rotary (1-20)	5
Republic® Rotary	2
Scotts® EasyGreen®	26
Scotts® EdgeGuard®	4½
Scotts® SpeedyGreen® 2000, 3000	4½
Sears® Craftsman Rotary	5
Sta-Green® Rotary (1-10)	3
True Temper® Rotary	4
Vigoro® Rotary (1-10)	3

Drop Spreaders
Esparcidores por voleo

	Setting / *Graduación*
Agri-Fab® Drop	4
Greenview® Drop-Spred® XP1	16
Red Devil® Drop (1-5)	4
Republic® Drop	5½
Scotts® Drop AccuGreen® (2-18)	5½
Scotts® Drop PF1 (2-18)	7½
Sta-Green® Drop (1-5)	4

Weeds

Annual yellow sweetclover
Aster
Austrian fieldcress
Bedstraw
Beggarticks
Betony, Florida
Bindweed, field
Bird vetch
Bitter wintercress
Bittercress, hairy
Bittersweet
Black-eyed Susan
Black medic
Black mustard
Blackseed plantain
Blessed thistle
Bloodflower milkweed
Blue lettuce
Blue vervain
Bracted plantain
Bristly oxtongue
Broadleaf dock
Broadleaf plantain
Broomweed
Buckhorn
Buckhorn plantain
Bulbous buttercup
Bull thistle
Bullnettle
Burclover
Burdock
Burning nettle
Burweed
Buttercup
Buttonweed
Canada thistle
Carolina geranium Carpetweed
Catchweed bedstraw
Catnip
Catsear
Chickweed: common, mouseear
Chicory
Cinquefoil
Clover: crimson, hop, red, strawberry, sweet, white
Cockle
Cocklebur
Common mullein
Creeping jenny
Cudweed
Curly dock
Daisy: English, oxeye
Daisy fleabane
Dandelion
Dichondra
Dogfennel
Dollarweed
False dandelion
Falseflax
False sunflower
Fiddleneck
Florida pusley
Frenchweed
Galinsoga
Goldenrod
Ground ivy
Gumweed
Hairy fleabane
Hawkweed
Healall
Heartleaf drymary
Heath aster
Hedge bindweed
Hedge mustard
Henbit
Hoary cress
Hoary plantain
Hoary vervain
Horsenettle
Jimsonweed
Knawel
Knotweed
Kochia
Lambsquarters
Lespedeza
Mallow
Matchweed
Mexicanweed
Milk vetch
Morningglory
Mouseear hawkweed
Mugwort
Musk thistle
Mustard
Narrowleaf plantain
Narrowleaf vetch
Nettle
Orange hawkweed
Oriental cocklebur
Oxalis
Parsley-piert
Parsnip
Pearlwort
Pennycress
Pepperweed
Pigweed
Pineywoods bedstraw
Plains coreopsis
Plantain
Poison ivy
Poison oak
Pokeweed
Poorjoe
Prairie sunflower
Prickly lettuce
Prickly sida
Prostrate knotweed
Prostrate pigweed
Prostrate spurge
Prostrate vervain
Puncturevine
Purslane, common
Ragweed
Red sorrel
Redroot pigweed
Redstem filaree
Rough cinquefoil
Rough fleabane
Russian pigweed
Russian thistle
Scarlet pimpernel
Scotch thistle
Sheep sorrel
Shepherdspurse
Slender plantain
Smallflower galinsoga
Smooth dock
Smooth pigweed
Sorrel
Sowthistle
Spanishneedles
Speedwell
Spiny amaranth
Spiny cocklebur
Spiny sowthistle
Spotted catsear
Spotted spurge
Spurweed
Stinging nettle
Strawberry, India mock
Tall nettle
Tall vervain
Tansy ragwort
Tansy mustard
Tarweed
Thistle
Trailing crownvetch
Tumble mustard
Tumble pigweed
Velvetleaf
Venice mallow
Virginia buttonweed
Virginia creeper
Virginia pepperweed
Wavyleaf bulthistle
Western clematis
Western salsify
White mustard
Wild aster
Wild buckwheat
Wild carrot
Wild four-o'clock
Wild garlic
Wild geranium
Wild lettuce
Wild marigold
Wild mustard
Wild onion
Wild parsnip
Wild radish
Wild rape
Wild strawberry
Wild sweet potato
Wild vetch
Woodsorrel
Woolly croton
Woolly morningglory
Woolly plantain
Wormseed
Yarrow
Yellow rocket
Yellowflower pepperweed
& other broadleaf weeds

Warranty

The distributor warrants that this product conforms to its chemical description and is reasonably fit for the purpose stated on the label when used in accordance with directions under normal conditions of use, but neither this warranty nor any other warranty of merchantability or fitness for a particular purpose, expressed or implied, extends to the use of this product contrary to label instructions, or under abnormal conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to distributor, and buyer assumes the risk of any such use.

Preen® is a registered trademark of Lebanon Seaboard Corporation.

h/10

PREEN GUARANTEE

Lebanon Seaboard Corporation guarantees you will be satisfied with the performance of this product when used as directed, or your money back. If not satisfied, describe the nature of your problem, and send with proof of purchase to:

LEBANON SEABOARD CORPORATION
1600 EAST CUMBERLAND STREET, LEBANON, PA 17042

1-800-233-1067 **www.preen.com**

GARANTÍA PREEN

Lebanon Seaboard Corporation le garantiza que, si usted no queda satisfecho con el producto luego de usarlo como se indica, se le reembolsará su dinero. Si no está satisfecho, describa la naturaleza de su problema y envíelo con el comprobante de compra a:

Garantía

El distribuidor garantiza que este producto se ajusta a su descripción química y es razonablemente adecuado para el propósito indicado en la etiqueta cuando se usa según las instrucciones en condiciones de uso normales; sin embrago, ni esta garantía ni ninguna otra garantía de comercialidad o idoneidad para un fin en particular, expresa o implícita, se extiende al uso de este producto de manera contraria a las instrucciones indicadas en la etiqueta o bajo condiciones anormales que no puedan ser previstas de manera razonable por el distribuidor, en cuyo caso el comprador asume el riesgo de dicho uso.

Preen® es una marca registrada de Lebanon Seaboard Corporation.

h/10

PRECAUTIONARY STATEMENTS
Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if absorbed through skin. Harmful if inhaled. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing dust. Causes moderate eye irritation. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Wear long-sleeved shirt and long pants, socks, shoes and gloves. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID

IF ON SKIN OR CLOTHING:	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.	Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. For additional information in case of emergency, call toll free (888) 208-1368.
IF INHALED:	• Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or ambulance, then give artificial respiration, preferable mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.	
IF IN EYES:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 - 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.	
IF SWALLOWED:	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.	

Environmental Hazards

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk or street back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

EPA Reg. No. 2217-640-961

(L) EPA Est. 961-PA-01:961-IL-01
(D) Superscript used is first letter of lot number.
El superíndice usado es la primera letra del número de lote.

DETÉNGASE! LEA LA ETIQUETA COMPLETA PRIMERO. CUMPLA CON TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE.

Instrucciones de uso

Es una violación a la ley federal utilizar este producto de manera contraria a lo establecido en la etiqueta.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES:

- *No aplique el producto de ninguna manera en que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea directa o indirectamente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación. No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado.*
- *Aplique cuando el aire esté calmo. No lo aplique sobre céspedes recién sembrados. No exceda la dosis indicada para ningún área. Cierre las aberturas del esparcidor al rotario durante la aplicación.*
- *No use este producto en plantas deseadas o cerca de ellas, incluida la línea de goteo de las raíces de los árboles y arbustos deseados, ya que puede provocar daños.*
- *No lo aplique directamente en el agua, desagües de aguas pluviales, canaletas, cloacas o zanjas ni cerca de éstos. No lo aplique a menos de 7,62 metros de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No lo aplique bajo condiciones de viento. Aplique este producto directamente en el césped y barra el producto que caiga sobre la entrada de garaje, la acera o la calle levantándolo de vuelta al césped. Para evitar que el producto escurra, no riegue en exceso las áreas tratadas ni aplique cuando esté lloviendo o cuando se esperen lluvias dentro del día.*

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenarlo o eliminarlo
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: *Conserve en el envase original en un área fresca, seca y alejada del calor extremo y la luz solar directa. No almacene cerca de alimentos, semillas u otros pesticidas.* ***ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE:*** *El envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni rellene este envase. Si está vacío: Colóquelo en la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca deseche el producto sin usar en desagües en interiores o exteriores.*

Precauciones de uso

No permita que el material se acumule en flores, vegetales o arbustos ornamentales. Aplique cuando el aire esté calmo. No lo aplique sobre céspedes recién sembrados. No aplique en áreas en las que haya raíces de árboles y arbustos de su agrado. No exceda las dosis indicadas para cada área; sea especialmente cuidadoso en la línea de riego de los árboles y otras especies ornamentales. Cierre las aberturas del esparcidor al rotario durante la aplicación. No contamine las aguas domésticas o de irrigación. No use este producto en plantas deseadas o cerca de ellas, incluida la línea de goteo de las raíces de los árboles y arbustos deseados, ya que puede provocar daños. No lo aplique directamente en agua, desagües de aguas pluviales, canaletas, cloacas o zanjas de desagüe ni cerca de éstos. No lo aplique a menos de 7,62 metros de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios, bahías y océanos. No lo aplique bajo condiciones de viento. Aplique este producto directamente en el césped y barra el producto que caiga sobre la entrada de garaje, la acera o aplicarán en caso de lluvia o cuando se espera que llueva ese día.

Instrucciones

El controlador de malezas de hoja ancha de césped Preen, controla una gran variedad de malezas de césped incluyendo dientes de león, pamplinas, ortigas, lechetreznas y muchas otras que a menudo se encuentran en el césped de las casas. Podría ser necesario un nuevo tratamiento si (a) el césped está excesivamente invadido por malezas; o (b) si prevalecen condiciones adversas de humedad baja y las malezas están en un período de crecimiento pobre. Se puede realizar una segunda aplicación en aproximadamente 30 días.

Para su uso en tepes establecidos de estaciones cálidas, incluyendo césped Bermuda, césped ciempiés y césped zoysia. Tepes establecidos de estación fría, incluyendo césped azul de Kentucky, festuca alta y festucas altas tipo tope. No aplique este producto sobre césped alfombra, oreja de ratón, césped San Agustín o tepes establecidos con tréboles que sean de su agrado.

La dosis máxima de aplicación es de 0,91 kg de producto por cada 92,90 m² por aplicación.

1. *La cantidad máxima de aplicaciones por dispersión se limita a 2 por año, con un mínimo de 30 días entre aplicaciones. La dosis máxima por temporada es de 1,81 kg de producto por cada 92,90 m².*
2. *Corte el césped a altura normal 1 a 2 días antes de la aplicación. Riegue bien el césped al menos 1 día antes de la aplicación para mantener la humedad hasta el siguiente riego (consulte el paso 4).*
3. *Aplique cuando las malezas estén jóvenes y creciendo activamente, de preferencia por la mañana cuando hay rocío sobre el césped. Si el césped no está húmedo al momento de la aplicación, rocíe levemente con agua para permitir que lo gránulos se adheran y se mantengan en la superficie de las hojas de las malezas.*
4. *No moje las hojas de las malezas por 1 ó 2 días después de la aplicación. Tras ese período se debe realizar un riego riguroso.*

Broadcast Spreaders
Esparcidor por dispersión

	Setting / *Graduación*
Agri-Fab® Rotary	5
Cyclone® Rotary	4
Earthway® Rotary	16
Greenview® Jet-Spred® SS1	16
Lesco® Rotary (dial A-S)(number dial)	G /15
Red Devil® Rotary (1-20)	5
Republic® Rotary	2
Scotts® EasyGreen®	26
Scotts® EdgeGuard®	4½
Scotts® SpeedyGreen® 2000, 3000	4½
Sears® Craftsman Rotary	5
Sta-Green® Rotary (1-10)	3
True Temper® Rotary	4
Vigoro® Rotary (1-10)	3

Drop Spreaders
Esparcidores por voleo

	Setting / *Graduación*
Agri-Fab® Drop	4
Greenview® Drop-Spred® XP1	16
Red Devil® Drop (1-5)	4
Republic® Drop	5½
Scotts® Drop AccuGreen® (2-18)	5½
Scotts® Drop PF1 (2-18)	7½
Sta-Green® Drop (1-5)	4

Graduaciones recomendadas del esparcidor

Es importante seguir las instrucciones como se indica en este producto para el cuidado del césped de calidad, ya que aplicar más de lo debido podría dañarlo. Las graduaciones del esparcidor son aproximadas.

Se pueden producir diferencias debido a las condiciones de la esparsión, la velocidad con la que se aplica y la escabrosidad del área tratada. Asegúrese de revisar el esparcidor antes de comenzar y haga ajustes de ser necesario. Consulte el Manual del propietario. Nunca aplique manualmente.

Las graduaciones del esparcidor son aproximadas. Calibre su esparcidor en 9,29 m² y ajuste para aplicar a una relación de 0,45 kg de producto por cada 45,45 m² (0,91 kg de material por cada 92,90 m²). El índice de caminatas, humedad y condición del esparcidor puede hacer variar las graduaciones necesarias para la aplicación de la cantidad correcta.

Esparcidores por dispersión: Aplique en una sola pasada a una relación de 0,91 kg por cada 92,90 m². Comience en el borde externo y aplique caminando de manera circular hacia el centro. Superponga la cubierta levemente y apague el esparcidor antes de hacer giros difíciles.

Esparcidores por voleo: Aplique en una sola pasada a una relación de 0,91 kg por cada 92,90 m². Comience en el borde externo y aplique caminando de manera rectangular de adelante hacia atrás a lo largo del césped. Superponga la cubierta levemente y apague el esparcidor antes de hacer giros difíciles.

Si su modelo de esparsidor no aparece, visite nuestro sitio Web www.preen.com o llame gratis al (800) 233-1067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. hora del verano del Este, para conocer graduaciones adicionales del modelo.

Malezas

Trébol de olor amarillo anual
Aster
Gallo de radicula austriaca
Amor seco
Estaquilla de Florida
Corrihuela
Veza de pájaro
Hierba de Santa Bárbaram amarga hairy Bittersweet
Hierba amarga peluda
Rudbeckia
Lupulina
Mostaza negra
Plantago rugelii
Cardo thistle
benito Flor de sangre
Lechuga azul
Blue vervain Bracted plantain
Verbena azul Plantago patagónico
Raspasayos
Lengua de vaca
Llantén Escobilla
Cholla espinosa
Llantén peludo
Hierba velluda
Cardo común
Solano de Carolina
Trébol de carretilla
Bardana
Ortiga brava
Cadillo
Botón de oro
Hierba de botón
Cardo negro
Geranio silvestre de Carolina
Cutanillo
Amor de hortelano
Hierba gatera
Hierba del halcón
Pamplina: común, cerastio
Achicoria
Cincoenrama
Trébol: enzarnado, amarillo, rojo, fresa, de olor, blanco
Cizaña
Cardo ajonjonero
Verbasco
Hierba de la moneda
Siempreviva
Romaza
Margarita: Inglesa, mayor
Erigeron annuus
Diente de león
Oreja de ratón
Manzanilla loca
Acaricoba
Falso diente de león
Alegría falsa
Girasol falso Ortigulilla
Ipecacuana de Florida
Carrasquique
Albahaca silvestre
Vara de oro
Hierba rastrera
Grindelia
Rama negra
Velloisilla
Hierba del carpintero
Golondrina
Aster común
Correhuela mayor
Erísimo
Ortiga muerta
Masfuerzo oriental
Llantén medio
Verbena stricta
Solano americano
Higuera loca
Escleranto (Flor de Bach)
Lengua de pájaro
Pinillo
Cenizo
Trébol de los prados
Malva
Lippia
Caperonia
Astrágalo
Dondiego de día
Velosilla oreja de ratón
Artemisa pegajosa
Cardo pendiente
Mostaza
Llantén de hoja estrecha
Algarroba
Ortiga
Velosilla anaranjada Guisaso de caballo
Jocoyote
Alquimila arvense
Chinivia
Clavellín antárnico
Modocillo
Lepidio
Bledo
Galio del bosque
Bella Diana
Plantago
Hiedra venenosa
Árbol de las pulgas
Hierba carmín
Diodia teres Walter
Girasol silvestre
Escarola
Ábata hembra
Sanguinaria postrada
Bledo rastrero Golondrina postrada
Verbena bractesta Roseta francesa
Verdolaga Ambrosía común
Escoba de amargosa
Yuyo colorado
Alfilerillo
Potentilla norvegica
Erigeron strigosus
Amaranto
Cardo ruso
Pimpinela escarlata
Cardo borriquero
Acederilla Bolsa de pastor Llantén delgado Albahaca silvestre de flores pequeñas
Romaza suave
Cenizo suave
Sorrel
Cerraja
Bidente Verónica
Bledo espinoso
Cola caballo
Cerraja espinosa
Hierba del chancho
Hierba de las golondrinas
Hierba de pollo
Ortiga mayor
Fresa de la India
Ortiga verde
Verbena ilia
Hierba de Santiago
Parnia
Polígono anfibio
Cardo
Coronilla varia rastrera
Nabón
Bledo blanco Malva amarilla
Flor de una hora
Hierba de botón de Virginia
Enredadera de Virginia
Lentejilla
Cardo de hoja ondulada
Clemátide
clematis
occidental
Salsifi occidental
Mostaza blanca
Aster silvestre
Geranio manchado
Lechuga silvestre
Chinchilla
Mostaza silvestre
Cebolla silvestre
Chirivía silvestre
Rabizón
Rabaniza
Fresa silvestre
Camote silvestre
Vicia
Acedera menor
Hierba de cabra
Rosa de madera hawaiana
Isgáguila
Santónico
Milenrama
Berro silvestre
Mastuerzo de flor amarilla y otras malezas de hoja ancha

AVISOS DE PRECAUCIÓN
Riesgos para seres humanos y animales domésticos

PRECAUCIÓN: *Nocivo si se absorbe por la piel. Nocivo si se inhala. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite respirar el polvo. Provoca una irritación moderada de los ojos. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mastticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro. Use camisa de mangas largas y pantalones largos, medias, zapatos y guantes. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.*

PRIMEROS AUXILIOS

SI ESTÁ EN LA PIEL O EN LA ROPA:	• Quítese la ropa contaminada. • Enjuague la piel inmediatamente con abundante agua por 15-20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.	Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información adicional en caso de emergencia, llame gratis al (888) 208-1368.
SI SE ASPIRA:	• Lleve la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.	
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:	• Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. • Si lleva lentes de contacto puestos, quíteselos luego de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento	
SI SE INGIERE:	• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. • Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua. • No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos. • Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.	

Peligros para el medio ambiente

*Este pesticida es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos y puede tener efectos adversos en plantas que no eran el objetivo del tratamiento. Para proteger el medio ambiente, no deje que el pesticida entre o escurra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo, cuando no haya pronóstico de lluvia durante las siguientes 24 horas, ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle levantándo de vuelta al área tratada del césped o jardín para evitar que escurra hacia aguas superficiales o sistemas de desagüe. Este producto químico tiene propiedades y características asociadas con agentes químicos detectados en agua del subsuelo. El uso de este producto químico en áreas donde el suelo es permeable, especialmente donde las napas de agua son de poca profundidad, puede ocasionar contaminación del agua del subsuelo. La aplicación alrededor de una cisterna o pozo puede ocasionar contaminación del agua potable o agua del subsuelo.